

Alle patiënten met  
pancreascarcinoom

1. Symptomen

• **Symptomen van enzymtekort**

Steatorroe of verandering in ontlasting (geur, kleur en consistentie)

Darmrommelingen, flatulentie, opgeblazen gevoel, toename in ontlastingsfrequentie en -volume

• **Ongewenst gewichtsverlies**

> 10% in 6 maanden of

> 5% in 3 maanden

2. Bepaal fecale elastase-1 (FE-1)

*FE-1 < 200mg/L*

Start enzymen  
en verwijst  
naar diëtist

*FE-1 ≥ 200mg/L en  
≥ 1 symptomen van  
enzymtekort*

Start enzymen  
en verwijst  
naar diëtist

*FE-1 ≥ 200mg/L  
en ongewenst  
gewichtsverlies*

Verwijst naar  
diëtist

*FE-1 ≥ 200mg/L  
en geen  
symptomen*

Geen  
behandeling

Startdosering

**Type enzymen**

Creon Forte (lipase 25.000 FIP-E, 300mg)

Pancrease 'HL' (lipase 25.000 FIP-E)

Panzytrat (lipase 25.000 FIP-E)

**Ontbijt-lunch-diner**

1 – 1 – 2 capsules

1 – 1 – 2 capsules

1 – 1 – 2 capsules

**Drinkvoeding of**

**tussendoortje met vet**

1 capsule

1 capsule

1 capsule

Bij vragen: neem contact op met diëtist